

ABSTRAK

Dukungan sosial adalah suatu dukungan yang diberikan orang-orang yang ada disekitar seperti keluarga, sahabat, teman dan tetangga, pada pasien-pasien rawat jalan maupun rawat inap dukungan sosial sangat dibutuhkan untuk membantu kesembuhan dari pasien tersebut, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencari hubungan antara dukungan sosial pada penderita beberapa penyakit dengan derajat depresi. Salah satu penyebab munculnya depresi adalah rendahnya dukungan sosial.

Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan desain *cross sectional*. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 84 orang pasien yang menderita stroke non hemoragik yang diambil dari data rekam medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan minimal menderita stroke non hemoragik 3 bulan, dan 84 pasien mengisi kuesioner dukungan sosial dan kuesioner *Beck Depression Inventory II* (BDI II).

Karakteristik dukungan sosial pada pasien stroke non hemoragik pada penelitian ini adalah pasien dengan dukungan sosial tinggi yaitu 78(92,9%) orang dan sangat tinggi yaitu 6 orang (7,1%) . dan karakteristik derajat depresi terbanyak adalah dengan depresi minimal 72 orang (85,7%). Dengan hasil uji korelasi *product moment* antara dukungan sosial dengan derajat depresi didapatkan nilai $r = -0,8$ dan nilai $p = 0,377$

Dukungan sosial tidak berpengaruh pada derajat depresi dimana tinggi rendahnya tidak berpengaruh pada derajat depresi.

Kata kunci : Dukungan sosial, derajat depresi, stroke non hemoragik, BDI II (*Beck Depression Inventory II*)

ABSTRACT

Social support is a support provided by existing people around such as family, friends, friends and neighbors, in outpatients and inpatient social support is urgently needed to help the patient's persistence, several studies have been done to find the connection between support social in patients with some disease with degrees of depression. One of the causes of depression is the lack of social support.

This research is an observational analytic research with cross sectional design. The sample in this study consisted of 84 patients who suffered a non hemorrhagic stroke taken from the medical record of Sultan Agung Hospital Semarang and had at least 3 months non-hemorrhagic stroke, and 84 patients filled out the social support questionnaire and the Beck Depression Inventory II (BDI II).

Characteristics of social support in non hemorrhagic stroke patients in this study were patients with high social support of 78 (92.9%) people and very high at 6 people (7.1%). and characteristic of most depression degree is with depression of at least 72 people (85,7%). With result of product moment colleration test between social support with degree of depresi got value $r = -0,8$ and p value $0,377$.

Social support does not affect the degree of depression where high low does not affect the degree of depression.

Keywords: Social support, degree of depression, non hemorrhagic stroke, BDI II (Beck Depression Inventory II)