

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil SPSS

Logistic Regression

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	1.098	.369	8.835	1	.003	2.997	1.453	6.182
	Constant	-2.532	.450	31.622	1	.000	.080		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	JK	1.776	.288	38.030	1	.000	5.908	3.360	10.391
	Constant	-3.807	.462	67.865	1	.000	.022		

a. Variable(s) entered on step 1: JK.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Perokok	-1.449	.331	19.112	1	.000	.235	.123	.450
	Constant	.634	.429	2.179	1	.140	1.885		

a. Variable(s) entered on step 1: Perokok.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	DM	.926	.325	8.134	1	.004	2.525	1.336	4.773
	Constant	-2.872	.592	23.544	1	.000	.057		

a. Variable(s) entered on step 1: DM.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	HT	.344	.270	1.623	1	.203	1.410	.831	2.393
	Constant	-1.776	.416	18.214	1	.000	.169		

a. Variable(s) entered on step 1: HT.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	LDL	.405	.224	3.282	1	.070	1.499	.967	2.324
	Constant	-2.340	.610	14.700	1	.000	.096		

a. Variable(s) entered on step 1: LDL.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Gizi	.044	.246	.033	1	.856	1.046	.646	1.692
	Constant	-1.347	.380	12.552	1	.000	.260		

a. Variable(s) entered on step 1:
Gizi.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a Usia	1.460	.443	10.853	1	.001	4.307	1.807	10.266
JK	2.124	.415	26.190	1	.000	8.362	3.707	18.859
Perokok	-.670	.441	2.306	1	.129	.511	.215	1.215
DM	1.558	.393	15.687	1	.000	4.748	2.197	10.265
HT	.792	.338	5.496	1	.019	2.208	1.139	4.283
LDL	.184	.244	.565	1	.452	1.202	.744	1.940
Constant	-9.386	1.683	31.118	1	.000	.000		
Step 2 ^a Usia	1.496	.440	11.560	1	.001	4.463	1.884	10.571
JK	2.134	.414	26.576	1	.000	8.448	3.753	19.014
Perokok	-.693	.439	2.493	1	.114	.500	.212	1.182
DM	1.571	.393	15.981	1	.000	4.811	2.227	10.393
HT	.808	.337	5.750	1	.016	2.243	1.159	4.342
Constant	-8.980	1.585	32.082	1	.000	.000		
Step 3 ^a Usia	1.431	.430	11.064	1	.001	4.183	1.800	9.722
JK	2.502	.360	48.362	1	.000	12.203	6.029	24.699
DM	1.587	.390	16.545	1	.000	4.890	2.276	10.505
HT	.777	.336	5.363	1	.021	2.175	1.127	4.200
Constant	-10.333	1.383	55.821	1	.000	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, JK, Perokok, DM, HT, LDL.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	1.456	.444	10.726	1	.001	4.288	1.794	10.246
	JK	2.127	.416	26.116	1	.000	8.392	3.711	18.975
	Perokok	-.666	.443	2.256	1	.133	.514	.216	1.225
	DM	1.565	.398	15.457	1	.000	4.782	2.192	10.432
	HT	.796	.340	5.497	1	.019	2.217	1.140	4.315
	LDL	.186	.245	.575	1	.448	1.204	.745	1.945
	Gizi	-.035	.297	.014	1	.905	.965	.540	1.727
	Constant	-9.365	1.692	30.644	1	.000	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, JK, Perokok, DM, HT, LDL, Gizi.

Lampiran 2. Data Sampel

No CM	usia	jenis kelamin	Perokok	DM	HT	kadar LDL	BMI	status gizi	hasil PAC	signifikan/non signifikan
1046003	57	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya	171	27,4	Overweight	RCA CTO mid, LM (N), LAD stenosis 60% prox, LCX stenosis 60% prox, 60% mid	signifikan
1002283	69	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	179	24,8	Normal	RCA stenosis 80% distal, 90% prox PDA, LM (N), LAD stenosis 60% prox, 90% mid, LCX stenosis 80% prox, CTO di OM	signifikan
1270995	50	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	84	18,1	Underweight	RCA stenosis 20-30% mid & distal, LM stenosis 50% distal, LAD stenosis 90% prox, LCX stenosis 90% mid	signifikan
1272508	66	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	134	22,3	Normal	LAD stenosis 90% mid, LCX stenosis 90% mid, RCA CTO mid	signifikan
1261702	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	109	26,4	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30%, LCX stenosis 30%	non signifikan
1119914	49	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak	137	31,8	Overweight	CAD 3 VD, RCA 70-80% di prox-mid diffuse, trombus di prox 80% distal, LM (N), LAD CTO di prox, LCX stenosis 80% di mid	signifikan
1240527	55	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	148	27	Overweight	RCA stenosis 80% di mid, LM (N), LAD stenosis 50% di mid, di prox 90%, LCX stenosis 50% di prox, OM stenosis 90% di prox osteal	signifikan
1272851	42	Perempuan	Tidak	Ya	Tidak	114	33,7	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 95% di mid, LCX (N)	signifikan
1273101	53	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	139	26,11	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 70% di prox, 70% di mid, LCX (N), OM stenosis 70%	signifikan

1196267	55	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	141	27,1	Overweight	PDA stenosis 70% di mid, stenosis 70% di mid-distal, LAD stenosis 70% di prox-mid, LCX RCA stenosis 50% prox, 95% mid, LM (N), LAD stenosis 70% prox, LCX stenosis 70% mid RCA (N), LM (N), LAD stenosis 80% mid, 70% prox, LCX(N)	signifikan
1274643	53	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	46	24,5	Normal		signifikan
1111806	48	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak	146	22,6	Normal		signifikan
1000086	51	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	153	26,11	Overweight	RCA stenosis 50% mid, LM (N), LAD CTO prox, LCX stenosis 80% mid	signifikan
1275919	57	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	154	19,8	Normal	RCA CTO prox, LM (N), LAD stenosis 80% mid-distal, LCX stenosis 80% prox-distal	signifikan
1096320	56	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	100	23	Normal	RCA stenosis 60% prox, 70% mid, LM (N), LAD stenosis 70% prox, LCX stenosis 70% prox, 70% mid	signifikan
1222008	54	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	98	26,9	Overweight	RCA stenosis 90% prox, LM (N), LAD stenosis 90% prox, LCX (N)	signifikan
1052814	46	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	65	29,6	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX stenosis 50% reguler	signifikan
1276512	60	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	118	27,9	Overweight	RCA stenosis 60% prox, LM (N), LAD CTO mid, LCX CTO mid	signifikan
1277547	48	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	124	22,4	Normal	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX intermediete stenosis 70% osteal	signifikan
1276782	65	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	118	25,8	Overweight	RCA stenosis 50%, LM (N) CTO prox, LCX CTO mid	signifikan
1169990	56	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	83	21,9	Normal	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30% mid, LCX (N)	non signifikan
1227059	59	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	217	23,2	Normal	RCA stenosis 80% mid, LM (N), LAD stenosis 90% prox, LCX CTO prox, OM stenosis 80% prox, PL stenosis 70% prox	signifikan

1280893	61	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	59	24,11	Normal	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX stenosis 70% prox	signifikan
1228770	40	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	119	26,1	Overweight	RCA stenosis 30% mid, PLB stenosis 40% prox, LCX 70% mid, LAD CTO distal	signifikan
1010388	55	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	125	21	Normal	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30% mid, LCX (N)	non signifikan
1014458	43	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	129	24	Normal	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30% distal, LCX (N)	non signifikan
1283588	51	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	178	30,34	Overweight	RCA stenosis 90% prox, 70% mid, LM (N), LAD stenosis 50% prox, LCX stenosis 95% mid	signifikan
1171729	65	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	126	24,8	Normal	RCA stenosis 80% mid, LM (N), LAD stenosis 90% ostium	signifikan
1188725	57	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya	88	21,7	Normal	LAD stenosis 60% mid	signifikan
1260225	62	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	171	30,8	Overweight	RCA stenosis 60% prox, 60% mid, 90% distal, LAD stenosis 90% mid-distal, LCX stenosis 60% mid	signifikan
1227686	52	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	183	25,7	Overweight	RCA stenosis 60-80% prox-distal, LM stenosis 50% distal, LAD stenosis 90%, LCX stenosis 60% mid	signifikan
1154065	57	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	156	26,2	Overweight	LM (N), LAD (N), LCX (N), RCA stenosis 20% distal	non signifikan
1282311	47	Perempuan	Ya	Ya	Ya	174	34,9	Overweight	RCA stenosis 90% mid, LM (N), LAD stenosis 60% prox, 80% mid-distal, LCX stenosis 95% mid	signifikan
1285542	50	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak	200	22,7	Normal	RCA stenosis 70% distal, LM (N), LAD stenosis 80% mid, LCX CTO mid	signifikan
1275153	58	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	93	18,1	Underweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 80% mid, 70% distal, LCX (N)	signifikan
1243983	57	Laki- laki	Perokok	tidak	ya	138	28,4	Overweight	Stenosis 90 di prox LAD, CTO diprox LCX&RCA	signifikan

1041208	58	Laki_laki	Perokok	Tidak	Ya	154	31,6	Obese	Stenosis 80 di Mid RCA,CTO di Mid LCX & LAD	signifikan
1291963	56	Laki laki	Perokok	Tidak	Tidak	169	25,5	Overweight	Stenosis 95% di proks LAD,60% di mid	signifikan
1158306	69	Laki laki	Perokok	Tidak	Ya	159	20,2	Normal	RCA,90% di distal LCX	signifikan
1140982	62	Perempuan	Tidak	ya	Tidak	68	31,6	Obese	Stenosis 60% di proks LAD,CTO di Mid RCA	signifikan
1251494	53	Perempuan	Tidak	ya	Tidak	124	30,3	Obesitas	Stenosis 90% di Mid LAD	signifikan
1167240	56	Perempuan	Tidak	DM	tidak	127	25,7	Overweight	Stenosis 60% di Mid	signifikan
1294561	41	Laki - laki	ya	tidak	tidak	129	24,5	Overweight	Stenosis 90% di proks LAD,RCA	signifikan non
1264751	56	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	103	24,5	Overweight	Stenosis 30% di dist LAD	signifikan
1257888	59	Laki-laki	tidak	tidak	ya	189	31,4	Obese	Sten 60% di mid RCA& LAD, CTO di mid LCX	signifikan
1305115	36	Laki-laki	perokok	tidak	ya	97	26,5	Obese	Ste 60 % di RCA, CTO di proks LAD,CTO di mid LCX	signifikan
1293099	41	Laki-laki	tidak	tidak	tidak	130	23,6	Normoweight	Sten 80% di OM	signifikan
1184548	57	Laki-laki	tidak	tidak	ya	93	25,2	Obese	Sten 60% di IAD, 60% di mid LCX	signifikan
1306441	59	Laki-laki	Ya	Tidak	tidak	107	20,02	Normoweight	Sten 80% di prox LLAD,, 80% di mid, 70% di dst	signifikan non
1094734	48	Perempuan	Tidak	ya	Ya	193	33,67	Obesitas	Sten 30% di mid LAD	signifikan non
1307120	49	Laki-laki	perokok	tidak	tidak	180	29,4	Overweight	Sten 30 % di dist LCX	signifikan
1305846	60	Laki laki	Perokok	DM	tidak	236	25,9	Overweight	Sten 80 % di mid RCA, CTO distal LAD, 80% di proks LCX	signifikan
1306664	38	laki-laki	Perokok	Tidak	ya	55	27,2	Overweight	CTO di Mid RCA, prok LAD, Mid LCX	signifikan
1307080	58	laki-laki	perokok	tidak	ya	116	25,09	overweight	Cto di proks LAD, Sten 70% di proks, distal RCA	signifikan
1262451	62	Laki laki	tidak	ya	ya	88	22,22	Normoweight	Sten 70 di prok LAD, 80% di mid RCA	signifikan
									CTO di distt RCA, 80% di proks LAD, 60 % di dist LCX	signifikan

1307091	49	Laki laki	Perokok	Tidak	tidak		97	25,3	Overwight	Sten 60% di dist RCA	signifikan
1306410	60	Perempuan	tidak	tidak	ya		137	21,4	Normoweight	Steno 40 % di mid RCS	non signifikan
1307681	60	Laki-laki	tidak	ya	ya		106	20,14	Normoweight	Sten 60% Di proks RCA, 70% di proks LAD	signifikan
1306804	63										
1306804	Th	Laki laki	Perokok	tidak	Ya		111	22,2	Normoweight	Sten 70 % di dist LAD, 80% di ostia mid LCX	signifikan
1306580	67	Laki laki	Perokok	tidak	tidak		116	25,3	Normoweight	trombus di mid LAD	non signifikan
1307410	71	Perempuan	Tidak	tidak	Ya		96	22,4	Normoweight	CTO di Mid RCA LAD, Sten 90% di mid LCX	signifikan
1307665	49	Laki laki	Tidak	tidak	tidak		102	24,43	Normoweight	STEN 30% DI PROKS RCA	non signifikan
1308312	50	Perempuan	Tidak	ya	ya		98	38,36	obese	Sten 50 % di mid LCX	signifikan
1256242	57	Perempuan	Tidak	tidak	Ya		82	28,6	Overweight	sten 30 % di mid LAD	non signifikan
1175034	54	Laki laki	Tidak	Tidak	Ya		59	27,9	Overweight	Sten 95 % di Proks LCX, 60% di proks LAD	signifikan
1309835	41	Laki laki	Merokok	Tidak	Ya		143	22,79	Normoweight	CTO Di proks LAD, Sten 80% di mid RCA, 70% di dist LCX	signifikan
1083833	54	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak		131	28,71	Obese	Sten 40 % di proks LAD	non signifikan
1310766	55	Laki laki	Perokok	Tidak	HT		54	23,84	Normal	CTO di proks LAD, Sten 60% di Mid LCX	signifikan
1311534	57	Laki laki	Perokok	Ya	HT		143	21,48	Normal	Sten 70% di mid LAD	signifikan
1311525	41	Perempuan	Tidak	Tidak	HT		102	28,8	Obese	Sten 30 % di dist LCX	non signifikan
1311491	57	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya		142	24,47	Normoweight	80% didistleaf main, CTO di mid LCX, dist RCA, 70_80% di proks mid LAD	signifikan
1312037	36	Laki laki	Tidak	Tidak	Tidak		86	28,25	Obese	Sten 20 % di mid LAD	non signifikan

1312022	60	Perempuan	Tidak	Ya	Tidak	64	30,1	Obese	Sten 95% di mid RCA, 95% di mid LAD, 80% di mid LCX	signifikan
1312491	41	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	82	25,36	Overweight	Stenosis 80% di Mid RCA	signifikan
1312090	41	Laki-laki	Ya	Tidak	tidak	60	27,34	Overweight	Sten 60-70% di proks RCA, 70-80% di proks mid LAD, 60% di LCX	signifikan
1311405	73	Laki-laki	Ya	Tidak	tidak	146	19,47	Normoweight	Ste 60% di mid + dist RCA, CTO di mid LAD, 95% di mid LCX	signifikan
1311745	49	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	73	25,7	Overweight	Sten 90 di BV brand, CTO di LCX, 60-90 di prok mid RCA	signifikan
1311969	47	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	153	26,98	Overweight	Sten 70 di mid LAD, 95% di proks LCX	signifikan
1311998	39	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	87	30,50	Obese	Stenosis 90% di distal LAD	signifikan
1195912	51	Laki-laki	Perokok	ya	ya	152	29,4	Overweight	Sten 70 % di mid RCA, 80% di proks LAD, 90% di mid LCX	signifikan
1270679	61	laki-laki	perokok	ya	ya	129	20,32	Normoweight	Sten 70% di proks mid RCA, Total oklusi di proks LAD, 80% di proks LCX	signifikan
1312619	68	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	67	35,1	Obese	30 % di mid RCA, 70-80% di proks LAD, 70% di proks LCX	signifikan
104 9509	64	Laki-laki	Tidak merokok	DM	tidak	93	25,14	Overweight	80% di Proks RCA, 60-80% di proks dist LAD, CTO di mid LCX, 60% di ostia left main	signifikan
1225274	70	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	100	26,4	Overweight	60% & 70% di proks mid RCA, (0% di mid LCX, 60-70% di proks mid LAD	signifikan non signifikan
1313856	59	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	64	22,1	Normoweight	Sten 30% di mid LAD	signifikan
1313265	67	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	60	30,6	Obese	Sten 60% di mid LAD, 70% & 90% di mid & Dist LCX	signifikan non signifikan
1313841	62	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	120	29,21	obese	Sten 30 % di mid LAD & dist LCX	signifikan

1214190	81	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	134	17,3	Underwiegth	CTO di mid RCA, ostium LCX, sten 70 mid LAD	signifikan
1314107	53	laki-laki	ya	Ya	Ya	137	24,63	Overweight	Sten 80% di Mid RCA, 80% di proks LAD, CPO di proks LCX	signifikan
1313324	58	Perempuan	tidak	Tidak	Ya	192	28,24	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	non signifikan
1313935	54	Laki laki	Tidak	Tidak	Ya	173	23,88	Normoweight	Sten 80% di mid + distal RCA, CTO di proks LAD, sten 70% di proks LCX	signifikan
1313966	56	Laki laki	Tidak	Tidak	ya	86	31,5	obese	CTO di proks LAD, Steno 80 % di proks LCX	signifikan
1154864	75	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	110	23,58	Normoweight	Sten 80 % di proks ,& CTO di mid LAD	signifikan
									Sten 60% di proximal, 80% di mid, 70% di distal RCA, Sten 70% di distal LAD, Sten 40% di mid LCX	
1314764	57	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	115	27,58	Overweight		signifikan
1159659	76	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	104	23,37	Normoweight	Sten 60% di mid LCX	signifikan
1035381	44	Laki laki	Tidak	Tidak	Ya	253	28,77	overweight	Sten 40% di dist RCA, sten 60% di proks LAD	signifikan
									Sten 80% diproks & CTO di mid RCA, sten 70 % di mid	
1315233	52	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	75	23,28	Normoweight		signifikan
17052692	61	Laki-laki	tidak	tidak	Tidak	70	22,80	Normoweight	steno 95 % di RCA , 70% di proks LAD	signifikan
1301706	62	Laki-laki	Tidak	tidak	ya	58	27,3	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	non signifikan
1316342	68	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	109	27,01	Overweight	Sten 30% di proks LAD	signifikan
1313794	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak	102	26,6	Overweight	Sten 60% di Distal RCA	signifikan
									Sten 80% di mid RCA, 80% di mid LAD, 90% di mid LCX	
1316206	56	Laki laki	Ya	Ya	Tidak	88	26,5	Overweight		signifikan
1317341	53	Laki laki	Perokok	Tidak	Tidak	67	21,9	Normoweight	Sten 60 -70% di Mid RCA	signifikan
1318214	65	Laki - laki	Perokok	Tidak	Tidak	71	23,7	Normoweght	CTO di mid LAD	signifikan

1322000	57	Laki laki	Perokok	Tidak	Tdk 139/77	84	29,5	Overweight	Sten 80 % & 70% di prok & mid RCA, 70% di proks LAD, 60-70% di mid LCX	signifikan
1284911	50	laki - laki	Tidak	Tidak	Ya 142/83	196	28,04	Overweight	CTO di proks LCX	signifikan
1321664	67	Laki-laki	Perokok	Tidak	Tdk 130/80	123	21,09	Normoweight	80% di proks RCA, 60-70% di proks mid LAD, 90% di mid LCX	signifikan
1322819	55	Laki-laki	Perokok	Tidak	Tdk 110/60	146	18,73	Underweight	CTO di proks LCX, CTO di mid RCA, 80% di mid LAD	signifikan
1099688	60	Laki-Laki	Perokok	Tidak	Tdk 110/70	97	24,74	Normoweight	90 di proks RCA, 60% di distal LAD	signifikan
1316585	64	laki laki	Perokok	Tidak	Ya 166/59	119	24,7	Normoweight	70% di mid + 80% di dist LAD, CTO di dist LCX	signifikan
1191191	49	Laki- laki	Tidak	Tidak	TDK 120/80	100	29,17	Overweight	Sten90% di proks LAD	signifikan
1320632	61	Laki-Laki	Perokok	Ya	Ya 211/89	148	26,12	Overweight	STEN 80% DI PROKSW RCA, CTO DI MID LAD, 90% DI MID LCX	signifikan
1315238	56	Laki - laki	Perokok	Ya	Ya 140/90	72	30,85	Obese	Sten 70% di mid LAD,70% di dist LCX, CTO di proks RCA	signifikan
1322849	63	Laki - laki	Perokok	Tidak	Ya 203/79	231	21,0	Normoweight	CTO di mid RCA, 80%v diostial RCA, 60% di mid IAD, 70 % di mid LCX	signifikan
1321863	55	Perempuan	idak	Tidak	Tdk 120/80	73	26,58	Overweight	LAD , LCX , normal , RCA normal kecil	non signifikan
1323348	58	perempuan	tidak	tidak	tdk 120/70	100	20,0	normoweight	Sten 20 % di Mid LAD	non signifikan
1321785	61	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 166/106	164	28,7	Overweight	CTO di LCX , 95di mid LAD, 80% di mid RCA	signifikan
1323640	48	Perempuan	Tidak	Iya	Ya 147/80	121	30,30	Obese	Sten 95 % Di proks LAD	signifikan
1323389	56	Perempuan	Tidak	tidak	Ya 163/116	126	23,61	Normoweight	Sten 60% di mid RCA, 70-80% di proks mid LAD, 80& di proks LCX	signifikan
1304851	71	Laki - laki	Merokok	Tidak	Tdk 130/90	88	24,69	Normoweight	CTO di RCA, Sten 70-80% di proks mid LAD, 80% di proks LCX	signifikan

1322388	56	laki laki	Merokok	DM	Ya 150/88	104	26,7	Overweight	Sten 80% di mid + 70 di dist RCA, CTO di mid LCX, 90% di mid LAD, 70% di dsit LM	signifikan
1067218	57	laki-laki	Merokok	tidak	tidak 97/60	111	32,8	obese	RCA PCO di mid, left man normal, LAD stenosis 60% di distal, LCX normal,	signifikan
1324782	48	laki laki	Merokok	tidak	ya 176/118	100	21,15	normoweight	RCA CTO, Left main stenosis 50% di distal, LAD CTO di mid, LCX normal	signifikan
1306758	62	perempuan	tidak	tidak	ya 163/89	158	27,02	obese	RCA 80% mid, LAD stenosis 80% mid, LCX CTO mid	signifikan
1280543	59	Laki- laki	merokok	tidak	tdk 149/81	103	26,9	Overweight	RCA 70% di proksimal dan mid, LEFT MAN Normal, LAD 70% di proksimal dan mid, LCX CPO di mid	signifikan
1151332	59	Laki - laki	tidak	ya	tdk 103/59	87	21,7	Normoweight	RCA CTO di mid, LEFT MAN 40% di distal, LAD CTO di MID, LCX 80% di MID	signifikan non signifikan
1323734	56	Laki - laki	Tidak	Tidak	tdk 115/78	149	28,30	Overweight	Sten 20% di dist LCX	signifikan
1180207	54	laki-laki	perokok	tidak	tdk/110/70	142	26,98	Overweight	Sten 80% di proks LAD, CTO di mid LCX, 30% di mid RCA	signifikan non signifikan
1310849	42	perempuan	Tidak	Tidak	tdk 125/75	76	17	Underweight	RCA normal, LAD normal, LCX stenosis 20% di distal, slow flow	signifikan
1149889	50	Laki laki	ya	Tidak	ya, 130/90	142	25,71	overweight	Sten 95% di mid RCA, CTO di proks LAD	signifikan
1296014	49	Laki - laki	ya	Tidak	tdk 118/68	107	24,46	Normoweight	CTO di mid RCA, Sten 70% di mid LAD	signifikan
1323992	55	Laki - laki	Ya	Ya	tdk 107/58	126	30,48	obese	sten 95 di mid RCA, 95% di dist LCX, 70% di mid - dist	signifikan
1324867	59	Perempuan	tidak	ya	143/80	93	28,5	obese	RCA 90% di mid,	signifikan non signifikan
1253156	48	Laki-laki	Merokok	Tidak	Tdk117/77	99	20,89	Normal	Normal Slow flow	signifikan
1321690	55	Perempuan	Tidak	Tidak	tdk 130/91	154	18,7	Underweight	Sten 80% di proks, + 70% di dist RCA, CTO di mid LAD, 60% di proks LCX	signifikan

1325135	58	Laki-laki	Ya	ya	Tdk 119/78	123	25,0	Normoweght	CTO di LCX, Sten 80% di mid - distal LAD, 80% di distal RCA	signifikan
1325228	63	Perempuan	tidak	ya	ya166/98	43	25,39	Normoweght	CTO di proks LCX, CTO di dist RCA, Sten 70-80% di mid - dist LAD	signifikan
1326824	56	laki - laki	ya	Tidak	ya, 150/91	146	26,59	Overwight	Stenosis 70 % di mid LAD, 60 % di mid LCX, 70-80% di proximal mid RCA	signifikan
1326160	49	Perempuan	Tidak	Tidak	tdk, 120/70	98	24,1	Normoweight	Ste 60% di proks RCA	signifikan
1326012	49	laki-laki	ya	tidak	tdk, 132/80	137	20,8	Normoweight	Sten 70-80% di mid dist LAD, 70% di mid RCA	signifikan
1264655	64	Perempuan	tidak	tidak	ya, 140/60	96	28,88	obese	Sten 90 % di proks LAD, 60% di proks RCA	signifikan
1107857	40	Perempuan	Tidak	DM	ya, 159/83	120	38,1	Obesitas	CTO di dist RCA,, sten 60 % didsit LAD	signifikan
1316892	67	Laki - laki	tidak	tidak	ya, 140/70	126	20,65	Normoweight	CTO di mid RCA	signifikan non
1328368	45	perempuan	tidak	no	no, 110/80	63	28,30	obese	Sten 30 % di mid distal	signifikan
1327480	43	Laki laki	Tidak	Tdk	Tdk 110/80	82	27,4	Overweight	Sten 80% di LAD Sten 80 di proks LAD , Sten 805 di proks 7 diist LCX	signifikan
1327024	57	Laki - laki	ya	Tidak	Tdk110/78	128	28,18	Obese		signifikan
1328362	57	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya, 172/88	109	30,98	Obese	Sten 60 % di proks LCX	signifikan
1329961	43	Laki-Laki	ya	ya	tdk, 130/80	132	32,6	obese	sten 90% di mid LAD normal	signifikan non
1328719	42	Laki-Laki	Ya	tidak	tdk130/80	87	25,83	Normoweight	Sten 30% di dsit LAD CTO did LAD, Sten 95 di mid LCX , sten 60% dimid RCA	signifikan
1329568	65	Perempuan	Tidak	Ya	ya, 184/107	158	29,48	Obese		signifikan
1328196	42	Laki - laki	tidak	ya	ya, 202/104	157	27,43	overweight	Sten 80% di mid LAD, Total oklusi di mid RCA Sten 60% di proks dist RCA, Total oklusi di proks LCX, Sten 70% dist LAD	signifikan
1328883	40	LAKI-LAKI	Tidak	ya	ya, 120/80	103	28,9	obese		signifikan non
1328980	41	Laki-Laki	Tidak	Tidak	tdk,100/60	78	22,65	normoweight	Sten 20% di dist LCX	signifikan

1329873	48	Laki - laki	Tidak	tidak	ya, 180/90	132	37,4	obese	Sten 70% di mid RCA, 95% di proks,80% di mid LAD, 95 % di dist LCX	signifikan non signifikan
1329744	59	perempuan	Tidak	Tidak	tidak, 126/70	50	21,8	normoweight	Sten 20% di proks LCX	signifikan
1329067	47	laki-laki	Tidak	Tidak	tidak, 82/51	87	20,67	normoweight	Sten 70% di mid LAD, CTO di proks RCA, CTO di dist LCX	signifikan
1328916	51	Laki laki	Tidak	Tidak	ya, 151/101	148	22,7	normoweight	Sten 30% di mid LAD, sten 60% di mid LCX, sten 40% di mid RCA	signifikan
1331968	60	laki-laki	Tidak	tidak	Ya 140/90	153	32,6	obese	Sten 70 di proks LAD	signifikan
1329807	47	laki-laki	YA	ya	ya, 136/72	136	37,1	obese	Sten 60% di mid RCA, 60% di mid LAD, CTO di mid LCX	signifikan non signifikan
1329815	48	perempuan	Tidak	ya	ya, 130/80	163	24,3	normoweight	Sten 20% di mid RC , 30% di mid LAD	signifikan non signifikan
1213088	64	perempuan	Tidak	ya	ya, 140/80	73	37,8	obese	Sten 20% di dist LCX	signifikan non signifikan
1241457	61	perempuan	tidak	tidak	tidak, 112/61	149	19,9	normoweight	Sten 20 di mid RCA, 40% di mid LAD	signifikan
1307933	70	Laki laki	Ya	tidak	Tdk 138/65	89	26,5	Overweight	Steno 20 % di Mid RCA, 30% di mid LCX, 60% di mid LAD	signifikan non signifikan
1144911	65	Laki-laki	ya	Tidak	tidak 130/80	144	20,8	Overweight	Sten 20% di mid RCA, 20% di mid LCX	signifikan
1332023	54	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya, 190/100	108	27,6	Overweight	Sten 70% di mid 80% di dist RCA, 70-80% di proks mid LAD , 80 di mid LCX	signifikan
1333993	57	laki-laki	Ya	ya	TIDAK,137/64	123	31,14	OBESE	Sten 80% di proks, 70% di mid LAD	signifikan
1299314	60	laki-laki	ya	tidak	ya, 168/78	149	21,78	normoweight	CTO di RCA, Sten 70 -80% di proks mid LAD, Sten 80% di proks dan Mid LCX	signifikan non signifikan
1332728	46	perempuan	tidak	Tidak	ya, 140/90	101	31,0	obese	Sten 20% di dist LAD	signifikan

1331499	58	laki-laki	ya	tidak	tidak,138/57	79	25,63	overweight	Sten 70-80% di proks & 70-80% di mid RCA, CTO di proks LCX	signifikan
1329874	47	perempuan	Tidak	tidak	ya, 140/90	109	28,60	obese	Sten 20 % di mid LAD	non signifikan
1307837	63	laki-laki	Ya	tidak	tidak, 136/76	101	30,3	obese	Sten 60% di proks & 80% di dist RCA, 60% di ostia & proks LAD,70% dist LCX	signifikan
1333627	60	laki-laki	Ya	tidak	tidak, 97/62	76	21,33	normoweight	Sten 60% di dist RCA, CTO di proks LAD	signifikan
1328224	76	Laki- laki	Tidak	Tidak	ya, 150/80	111	25,7	Overweight	Sten70-90% di proks LAD	signifikan
1013315	51	Perempuan	Tidak	ya	ya, 179/93	90	25,48	overweight	CTO di ostia LAD, Sten 90% di mid RCA, 30% di mid LCX	signifikan
1333437	50	Laki-laki	Ya	ya	Tidak, 105/88	110	26,29	Overweight	CAD stenosis 60% di RCA	signifikan
1334878	59	Laki- laki	Ya	Tidak	ya, 147/76	54	24,61	normoweight	CTO di ostia LAD	signifikan
1334631	55	perempuan	tidak	tidak	ya, 120/70	103	34,78	obese	Sten 30 % di distal LCX	non signifikan
1334661	79	laki - laki	tidak	Tidak	ya, 160/90	102	21,6	normoweight	Ste 80% di mid RCA, 60% di dist LAD	signifikan
1334027	54	Perempuan	Tidak	ya	Tidak, 120/70	170	23,9	normoweight	CTO di proks LAD, Sten 80% di dist LCX	signifikan
1321883	65	laki-laki	ya	ya	ya, 180/80	11	33,05	obese	Sten 60-70% di proks mid LAD,60-70% di mid LAD	signifikan
1243283	52	laki - laki	ya	ya	ya, 190/115	123	25,29	Overweight	Sten 90 di mid LA, 80% di mid LCX	signifikan
1334893	57	laki - laki	Tidak	Tidak	tidak, 136/76	130	22,77	normoweight	Sten 80% di proks mid LAD, 80% di prok & 90% di mid LCX, Total oklusi di mid RCA	signifikan
1334934	45	Laki- laki	ya	Tidak	ya, 140/100	139	25,7	Overweight	LCX stenosis 20% di MID	non signifikan
1180532	57	Laki laki	ya	ya	ya, 142/86	84	23,04	normoweight	Sten 60-70% di mid dist RCA, sten 80% di mid LAD	signifikan
1112361	53	laki - laki	tidak	tidak	ya, 160/90	144	37,9	Obese 2	Sten 70-90% di mid distal LAD, 60% di dist RCA	signifikan

1325685	59	laki - laki	perokok	ya	ya, 134/84	168	29,0	obese	Total oklusi di mid LAD & LCX	signifikan
17123441	63	laki-laki	ya	ya	ya, 147/85	130	25,39	overweight	CTO di mid LAD , Sten 80% di mid LCX	signifikan
1334254	67	laki - laki	ya	ya	ya, 155/100	69	26,03	Overweight	sten 60% di mid LAD, 70% di mid RCA, & 70% di proks LCX	signifikan
1337362	44	laki - laki	ya	ya	ya, 145/80	143	29,6	Overweight	Sten 60% di mid LAD , 30 % di dist LCX	signifikan
1336866	49	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya, 129/90	105	30,17	Obese	Sten 40% di proks LAD	non
1335018	39	Laki-laki	Ya	Ya	Ya, 149/92	108	29,9	overweight	CTO di proks LAD	signifikan
1334403	58	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya, 120/90	104	28,89	overweight	CTO di mid RCA & mid LAD, sten 80% di proks LCX, 50% di dist LM	signifikan
1339130	59	Perempuan	Tidak	Ya	Ya, 144/94	57	32,9	Obese	RCA Normal Kecil, LAD Stenosis 20% distal, LCX Normal	non
1336686	65	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya, 169/80	124	34,7	Obese	sten 70 di mid LAD	signifikan
1337252	60	Laki-laki	Ya	Ya	Ya, 141/70	79	21,8	Normoweight	Sten 80% di mid 95% di dist RCA, 80% proks LAD, 40% di mid LCX	signifikan
1338649	57	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak, 108/79	130	24,2	Normoweight	Sten 95% di mid RCA, CTO di mid LAD, 90% di proks LCX	signifikan
1334372	49	Laki-laki	Ya	tidak	Tidak, 103/58	197	26,7	Overweight	CTO proks LAD	signifikan
1336842	64	Laki-laki	Tidak	ya	Tdk 133/75	71	24,6	normoweight	CTO di Mid RCA, Sten 70-80% di proks mid LAD, 60-70% di mid	signifikan
1122612	35	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak, 100/70	90	24,2	Normoweight	LCX kecil sten 20% di dist	non
1032400	42	Laki - Laki	Ya	Tidak	Tidak, 130/80	91	34,5	Obese	Sten 30 % di mid LAD	non
1337483	49	Laki-laki	ya	Tidak	Tidak, 122/85	144	24,2	Normoweght	CTO di ostea LAD	signifikan
1277100	53	Laki-laki	ya	Tidak	Ya, 162/92	110	29,73	Obese	Sten 70 % di proks LAD	signifikan
1339564	54	Laki-laki	ya	tidak	Tidak,121/85	139	19,5	Normoweght	Sten 60 % di proks LAD	signifikan
1339992	60	laki - laki	ya	tidak	tidak, 106/62	64	21,67	Normoweight	Sten 80% di proks , Total oklusi di distal RCA	signifikan

1307434	59	laki-laki	ya	ya	tidak, 121/91	104	31,6	Obese	Sten 70% di Mid,90% didist RCA	signifikan non
1338057	60	Perempuan	Tidak	Tidak	ya, 200/60	100	21,13	Normoweight	Sten 40% di mid RCA, 30% di mid LCX	signifikan
1338719	54	Laki - Laki	ya	ya	tidak, 120/80	50	25,5	Obese	Sten 95% di mid+70% di dist LAD, 80% di Mid RCA	signifikan
1301824	60	Laki - Laki	YA	YA	YA 143/80	96	22,04	Normoweight	Sten 60% di mid distal LAD, Sten 20% di mid RCA	signifikan
1336725	53	Laki - Laki	YA	YA	TIDAK 106/78	75	22,26	Normoweight	Sten 80% di Mid +dist RCA, 90% di proks LAD, 80% di ostia LCX	signifikan
1271411	55	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya, 140/80	84	28,11	Obese	Sten 60% di mid + dist RCA, 80% di mid LAD, 60% di mid LCX	signifikan
1338965	57	Laki - Laki	ya	Tidak	ya, 167/120	163	28,67	overweight	Sten 60% di Mid RCA, 70% di diast LAD	signifikan
1318283	54	Laki-laki	ya	tidak	tidak, 105/97	110	25,17	overweight	Sten 80% dimid,CTO di dist RCA,80%-95% di md LAD, 80% di mid LCX	signifikan
1194898	60	Laki - Laki	ya	Tidak	ya, 154/104	73	24,24	Normoweight	CTO di mid RCA,,Sten 60% di mid - dist LAD, 80% di proks LAD	signifikan non
1341460	41	Laki - Laki	YA	Tidak	TIDAK	80	24,6	Normoweight	Sten 30% di proks LAD	signifikan non
1333026	57	Perempuan	Tidak	YA	TIDAK	84	29,48	overweight	Sten 30 di dist LAD	signifikan non
1327697	53	Perempuan	Tidak	tidak	ya, 130/90	141	26,48	Overweight	LCX kecil tidak berkembang	signifikan non
1339202	51	Perempuan	Tidak	tidak	ya,133/100	64	22,51	Normoweight	Sten 20% di dist LAD	signifikan
1340670	61	Laki-Laki	Tidak	Ya	ya 140/90	96	21,92	Normoweight	Sten 80% di proks mid RCA, 80% di Prok LAD, 80% di mid LCX	signifikan
1341178	54	Laki-laki	ya	tidak	tidak, 107/71	138	26,8	overweight	CTO di mid RCA, Sten 90% di proks LAD, 80% di mid LCX	signifikan

1202935	59	Laki - Laki	YA	YA	YA 134/80	99	41,2	overweight	sten 605 di LAD	signifikan
1250190	47	Perempuan	Tidak	YA	YA	115	40,4	overweight	Sten 30% di proks dist Rca, CTO di mid LAD	signifikan
1340889	75	Laki - Laki	Perokok	tidak	135/60 tidak	127	26,9	overweight	Ste 95% di proks,80% di dist LAD, 70% DI DIST LCX, 80% di proks, 70-80 dist LCX	signifikan
1268215	63	Perempuan	Tidak	ya	tidak 130/70	134	26,16	overweight	Sten 30 di mid RCA, 70-80% d9 mid dist LAD, CTO di mid LCX	signifikan
341784	56	Laki-Laki	Perokok	tidak	Tdk 112/67	71	20,4	Normoweight	Sten 95 % di mid LAD, 80% di dist LCX, 20% di mid RCA	signifikan
1316446	61	Laki - Laki	Ya	Ya	tdk 105/60	146	22,0	Normoweight	Sten 60% di dist LAD	signifikan
1342852	52	Laki - Laki	Tidak	YA	Tidak, 120/80	72	27,4	Overweight	CTO di di mid RCA, (5 % di mid LAD, CTO di mid LCX	signifikan
1341619	61	Laki - Laki	Ya	YA	YA, 200/100	108	26,33	overweight	CTO di proks RCA, Sten 70% di dist LAD, sten 70% 95% di dist ICX	signifikan
1019623	68	Perempuan	ya	YA	YA, 170/100	160	24,34	Normoweight	sten 70% di proks,70-80& di mid dist LAD,80% di poks & mid CTO dist LCX	signifikan
1274124	41	Laki-laki	Ya	YA	Tidak, 100/60	149	21,05	Normoweight	Sten 60% di proks LAD, 60% di mid LCX	signifikan
1337932	58	Laki - Laki	Tidak	YA	ya, 126/75	130	23,07	Normoweight	Sten 70% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di proks & mid RCA	signifikan non
1341714	46	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Tidak, 130/68	106	25,51	overweight	Sten 30 % di Dist LCX	signifikan
10339872	59	Laki - Laki	ya	tidak	ya	52	17,99	Underweight	Sten 70-80% di mid LAD	signifikan
1341385	55	Laki-Laki	Tidak	Ya	Tidak	168	26,15	Overweight	Sten 90% di proks LAD,Sten 60% di mid LCX	signifikan
1337203	69	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	124	24,19	Normoweight	sten 70% di proks LAD	signifikan
1261810	58	perempuan	Tidak	ya	tidak	198	29,43	overweight	Sten 90% di Ostea,80% di prok & Mid LAD, 80% di proks LCX	signifikan non
1326809	46	Perempuan	Tidak	tidak	tidak	142	36,31	Overweight	Sten 20 % di mid LAD	signifikan

1342836	47	perempuan	Tidak	Ya	ya 140/80	148	28,35	overweight	Sten 40% di proks LAD	non signifikan
1324212	65	perempuan	tidak	tidak	Tidak 120/70	83	22,7	normoweight	Sten 40% di mid RCA, 60% di proks LAD	signifikan
1335298	47	Perempuan	tidak	Tidak	ya 180/150	114	34,96	Obese	Sten 30% di mid LAD	non signifikan
1307066	40	Perempuan	Tidak	ya	Ya 131/84	146	26,56	Overweight	satn 30 % d dists RCA	non signifikan
1345071	59	Laki - Laki	ya	tidak	ya 150/90	111	26,4	overweight	Sten90% di dist RCA, 90% di proks LAD	signifikan
1289257	54	Laki-laki	ya	Tidak	ya 156/100	104	25,6	overweight	Sten 95% di mid LAD, 80% di mid LCX, CTO di mid RCA	signifikan
1342680	50	Laki - Laki	ya	ya	ya 140/70	116	24,09	Normoweght	Sten 90% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di dist RCA	signifikan
1345676	54	Laki - Laki	ya	Tidak	YA 195/116	181	27,3	overweight	Sten 60% di proks LAD, 60% di dist LCX	signifikan
1345753	57	Perempuan	Tidak	Tidak	YA 181/94	88	25,9	overweight	PROXIMAL LAD 50%	signifikan
1346366	56	laki - laki	Tidak	Tidak	ya 205/103	147	31,15	Obese	LAD 80% DI PROX,RCA 95% di mid , CTO di mid LCX	signifikan
1346479	64	Perempuan	Tidak	Tidak	ya/153/64	117	24,58	Normoweght	Sten 40% di mid RCA, 95% di mid LAD	signifikan
1343365	64	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak 114/66	99	24,04	Normoweght	Sten 20% di mid LAD	non signifikan
1341724	50	Laki - Laki	Tidak	Tidak	tidak, 128/78	151	28	Normoweight	CTO di proxLAD,Sten 80% di psoksmid LCX,CTO di mid RCA	signifikan
1346091	63	Perempuan	Tidak	ya	ya, 150/90	53	26,03	Overweight	Sten 80% di Proks RCA,80% di mid LAD,80% di mid LCX	signifikan
1347597	51	laki- laki	ya	Tidak	tidak, 119/72	142	29,4	overweight	CTO di mid RCA, CTO di proks LAD, Sten 70% di mid LCX	signifikan
1310509	60	perempuan	Tidak	Tidak	ya 140/90	165	24,4	Normoweight	Sten 50% di mid LCX, 40% di mid RCA	non signifikan

1328662	54	Perempuan	Tidak	tidak	ya 144/73	242	20,0	Normoweight	CTO di mid RCA, Sten 80-90% di proks mid LAD, 70% di mid LCX	signifikan
1348854	46	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya 160/90	135	31,9	Overweight	sten RCA 80 % di mid, 8) % di mid LAD	signifikan
1348468	57	laki- laki	Tidak	Tidak	tidak 119/81	76	22,15	Normoweight	Sten 30% di mid RCA	non signifikan
1300108	52	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Tidak, 130/80	115	24,03	Overweight	Sten 30 % di mid RCA	signifikan
1348880	50	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya, 190/100	69	34,19	Obese	Sten 60% di mid LAD	signifikan
1347161	50	Perempuan	Tidak	ya	ya/160/90	90	22,6	Normoweight	Sten 20 % di dist LCX	signifikan
1350632	65	Perempuan	Tidak	tidak	tidak/135/82	112	30,4	obese	Sten 70% di ostium	signifikan
1350880	58	Perempuan	Tidak	Tidak	ya, 130/80	158	21,3	Normoweight	Sten 30% di dist LCX	non signifikan
1350616	53	Laki - Laki	ya	Tidak	ya, 160/92 TIDAK,	99	33,42	Obese	CTO di mid LAD, Sten 60% di proks LCX	signifikan
1352212	58	Laki - Laki	Ya	Tidak	123/85	156	25,78	overweight	Sten 80% di mid LCX, 80% di proks RCA	signifikan
1351811	51	Laki - Laki	tidak	ya	tida, 135/93	80	22,6	normoweight	CTO di proks LAD, 60-70% di mid RCA, 60% di mid KCX	signifikan
1304510	63	Laki - Laki	ya	Tidak	Tdk 110/60	58	17,89	Underweight	CTO di mid RCA, 80% di mid LCX, 70% di mid LAD	signifikan
1115619	38	Laki - Laki	Ya	Tidak	Ya, 140/90 tidak,	72	25,34	Overweight	Total Oklusi di Distal RCA, Sten 80% di mid LAD	signifikan
1354702	55	Laki - Laki	ya	tidak	165/104	176	29,13	overweight	Cten 90% di proks & 70% di dist LAD	signifikan
1353543	73	laki- laki	Tidak	Tidak	tidak, 147/86	110	27,96	Overweight	CTO di Mid LAD, CTO di Proks LCX, CTO di mid RCA	signifikan
1347698	60	Laki - Laki	Tidak	tidak	ya 156/89	137	31,2	Obese	Sten 80% di proks , 90% di mid LAD	signifikan

1265790	50	Laki - Laki	Ya	Tidak	Tidak 120/70	122	21,25	Normoweight	Sten 80% di RCA, 30% left main, 70% di proks LAD	signifikan
1302067	58	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 110/70	124	26,67	overweight	sten 80% di mid LAD, LCX , RCA	signifikan non
1346068	59	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Ya 130/80	84	24,06	normoweight	Sten 30% di proks LAD	signifikan
1205424	55	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Ya 120/81	113	22,4	normoweight	Sten 80% di Mid LAD & Mid RCA	signifikan
1115190	56	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 130/62	75	22,2	Normoweght	Sten 70% di RCA, 80% di mid LAD, 80% di Mid LCX	signifikan non
1355504	35	Perempuan	tidak	Ya	tidak 134/88	69	25,87	Overweight	Sten 30% di Distal LCX	signifikan non
1351610	59	perempuan	Tidak	ya	ya 129/81	115	29,2	overweight	Sten 30 % di Dist LAD	signifikan
1312599	49	Laki-Laki	Tidak	Tidak	ya 154/79	192	27,34	overweught	Sten 70% di proks, 80% d mid LAD	signifikan
1354156	63	Laki-laki	Tidak	Tidak	ya 171/86	125	21,5	Normoweight	Sten 60% di mid LAD dan Mid LCX, 70% di proks RCA	signifikan
1354156	75	Laki-laki	Tidak	Ya	Tidak 110/60	86	20	Normoweight	Sten 80% di mid LAD, 60% di mid LCX	signifikan
1351793	61	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 164/81	123	22,2	Normoweight	Sten 90% di Mid & 80 di Dist LAD, 80% di Dist LCX, 80% di Mid RCA	signifikan
1349031	54	Laki - laki	Perokok	Tidak	Tidak 130/90	115	22,6	Normoweght	Sten 60% di RCA, 80% di Proks LAD, 60% di Mid & 70% di dist LCX	signifikan
1228856	61	Laki - Laki	Perokok	Ya	ya 140/90	44	23,1	Normoweght	Sten 90% di Proks Mid LAD, 90% di proks Mid & 80% di Dist RCA	signifikan
1354536	55	perempuan	tidak	ya	ya 132/92	92	22,06	normoweight	Total Uklusi di Mid RCA, 80% di Mid & Dist LAD, 70% di Mid & Dist LCX	signifikan
1355604	51	Laki - laki	ya	Tidak	ya 130/80	121	21,3	Normoweght	CTO di MID RCA, CTO di proks LAD	signifikan
1355602	68	Laki - laki	tidak	Tidak	ya 152/110	79	21,2	Normoweight	CTO di Mid RCA, 90\$ di proks LCX	signifikan
1230546	57	Laki-laki	Tidak	Tidak	ya 160/100	61	25,60	overweight	Total oklusi di mid LAD, 30% di mid LCX	signifikan

1355587	75	Laki-laki	Tidak	Tidak	ya 140/90	86	28,5	overweight	CTO di Mid RCA, CTO di ostia LAD , CTO di Dist LCX	signifikan non signifikan
1310202	60	Laki - Laki	Ya	Tidak	ya,140/80	131	28,04	overweight	Sten 40% di dist LAD	signifikan
1354448	56	Laki - Laki	Tidak	Tidak	tidak, 130/90	129	26,34	overweight	Sten 80% di proks , mid dan dist LAD, CTO di mid LCX, 80% di dist RCA	signifikan
1355977	60	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya 162/82	116	25,6	Overweight	Sten 80% di proks RCA, Total oklusi di dist LAD, 80% di mid LCX	signifikan
1355741	53	laki-laki	tidak	ya	Ya 140/90	133	3,1	overweight	Sten 80% di Mid LAD, 80% di mid LCX	signifikan
1354947	63	laki-laki	Ya	tidak	Ya 142/97	92	23,8	Normoweight	Sten 80% di proks ,90% di mid ,80% di dist LAD,dan 80% proks, 90% di mid LCX	signifikan
1356606	53	laki - laki	Tidak	ya	Ya 150/90	63	28,45	Overweight	Total Oklusi di dist LAD	signifikan
1318082	49	perempuan	Tidak	ya	ya 170/100	49	25,2	overweight	Sten 60% di mid RCA, 60% di Proks LAD, 70-80% di proks mid LCX	signifikan
1195177	37	laki-laki	ya	tidak	tidak 110/70	138	27,2	overweight	Total oklusi di proks LAD, Sten 70% di proks RCA	signifikan
1335535	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 159/98	140	20,0	Normoweght	Sten 70% di ostium RCA, 30 % di Dist LAD	signifikan
1322447	70	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 128/80	64	20	Normoweght	Sten 80% di mid RCA, 70% di proks LAD	signifikan
1356775	54	Perempuan	Tidak	Ya	ya 166/98	124	36,5	overweight	CTO di Mid RCA, Sten 90% di Mid LAD, CTO di Dist LCX	signifikan
1357763	60	Laki - Laki	ya	Tidak	Ya 165/80	112	23,3	Normoweght	Sten 90% Mid LAD , 80% Mid LCX,Cto Mid RCA	signifikan
1357655	56	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 155/76	162	28,8	Overweight	RCS 90% Mid distal,LAD Proc Sub total,LCX 90% Mid distal	signifikan
1358243	58	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Ya 155/98	123	24,6	overweight	Total Oklusi di proks LAD, Sten 80% di Proks & Dist RCA, 70% di Proks OM LCX	signifikan
1357539	50	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 180/90	112	35,7	overweight	Sten 70% di Dist RCA, 40% di Mid LAD	signifikan

1238188	62	Perempuan	Tidak	ya	Ya T150/90	146	26,19	overweight	Sten 80% di Mud LAD, Restenosis di proks LCX	signifikan
1358266	71	laki - laki	tidak	Ya	ya, 155/87	107	29,06	overweight	CTO di mid LCX, Sten 80% di dist RCA	signifikan
1342071	46	Laki - laki	Tidak	Tidak	Tdk/ 111/74	100	20,7	Normoweight	CTO di proks LCX, Sten 80% di Proks - Dist LAD	signifikan
1358424	59	Laki-Laki	tidak	Tidak	ya, 139/86	45	25	overweight	Sten 95% di Proks LAD	signifikan non
1358170	46	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak 125/70	75	19	Normoweight	sten 30 % di Proks LCX	signifikan
1359202	54	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak 113/65	86	27,5	Overweight	CTO di Mid LAD, CTO di mid LCX, CTO di Mid RCA	signifikan
1359299	41	Laki - Laki	Perokok	Tidak	Tidak 110/70	73	19,53	Normoweght	Sten 80% di Dist RCA	signifikan
1275365	63	Laki - Laki	tidak	Tidak	Tidak 120/80	123	27,05	overweight	Sten 70 % di Mid LCX	signifikan
1233534	54	Perempuan	Tidak	ya	Ya 166/96	97	28,09	overweight	Sten 60% di mid dist RCA, CTO di mid LCX, sten 70% di md LAD	signifikan non
1359480	44	perempuan	tidak	ya	tidak 126/70	67	30,1	overweight	Sten 20% di Mid LAD	signifikan
1355975	68	perempuan	tidak	Tidak	ya, 171/79	75	18,7	Normoweght	Sten 70-80% di mid Dist LAD, Sten 40% di dist RCA	signifikan
1359593	67	Laki - Laki	Tidak	tidak	ya133/79	84	17,6	Normoweght	CTO di Ostium LAD, Sten 95% di Proks LCX, 70% di Dist Leaflet main	signifikan non
1284328	45	laki-laki	tidak	tidak	tidak 136/91	63	26,5	overweight	Sten 30% di Dist LAD	signifikan
1322928	68	Laki - Laki	tidak	tidak	tidak 138/90	58	41,8	obese	CTO di Mid LAD, Sten 80% di Mid RCA	signifikan non
1136406	58	laki-laki	tidak	tidak	tidak, 134/75	150	27,53	overweight	Sten 30% di Mid LAD	signifikan
1359555	46	laki-laki	ya	ya	ya 158/86	62	23,87	normoweight	CTO di Distal RCA, 80% di proks & misd LAD	signifikan
1360435	68	laki-laki	tidak	Tidak	Tidak 136/63	98	27,14	Overweight	Sten 90% di md RCA, 80% di mid LAD, CTO di mid LCX	signifikan

1360351	40	laki-laki	tidak	tidak	ya 163/97	81	32,0	overweight	Sten 30 % di Mid LAD	non signifikan
1360639	59	laki-laki	Tidak	Tidak	tidak 110/70	143	26,44	Overweight	Sten 60% di proks RCA, 80% di proks LAD, CTO di proks LCX	signifikan
1355466	36	perempuan	Tidak	ya	tidak 116/67	109	21,8	Normoweight	Sten 20% di Proks LAD, 30% di proks RCA	non signifikan
1359557	53	Perempuan	tidak	ya	tidak 136/76	45	22,5	Normoweght	Sten 30% di proks RCA	non signifikan
1315753	49	perempuan	tidak	tidak	tidak 120/80	71	30,1	Overweight	Sten 20% di dist RCA	signifikan
1361552	50	Laki - laki	ya	Tidak	Tidak 120/70	163	28,07	overweight	CTO di proks LCX	signifikan
1239009	57	perempuan	tidak	tidak	ya 141/84	103	21,42	Normoweight	Sten 20% di Dist LAD	non signifikan
1361552	50	Laki - laki	ya	Tidak	Tidak 120/70	163	28,07	overweight	CTO di proks LCX	signifikan
1239009	57	perempuan	tidak	tidak	ya 141/84	103	21,42	Normoweight	Sten 20% di Dist LAD	non signifikan

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian



Nomor : 620 /B/RSI-SA/II/2019
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian

Semarang, 14 Jumadits Sani 1440 H
06 Pebruari 2019 M

Kepada Yth
Dekan
Fakultas Kedokteran
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring rasa syukur semoga limpahan kasih sayang Allah SWT menyertai didalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita. Aamiin.

Menjawab surat saudara nomor: 467/KTI/SA-K/X/2018 perihal ijin penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Direktur RSI Sultan Agung dapat menerima mahasiswa berikut :

Nama : Hafida Zahara Hanun.
NIM : 30101507462
Fakultas / Prodi : Kedokteran
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Judul Penelitian : Hubungan Antara Kadar LDL Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Significant Dan Non Significant.

Untuk melakukan pengambilan data pasien di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

RSI SULTAN AGUNG SEMARANG

ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
dr. Minidjan Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.
Direktur Pendidikan

Tembusan

1. Ka. Instalasi Rekam Medis..
2. Penjab Rekam Medis Rawat Jalan & Rawat Inap.
3. Arsip.

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Jawa Tengah, Indonesia
Telp. +62 2465 800 19 | Fax. +62 2465 819 28 | Hotline : +62 85 100 41 2424
email : rs@rsisultanagung.co.id | www.rsisultanagung.co.id

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 24 /B/RSI-SA/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.
Jabatan ; Direktur Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Hafida Zahara Hanun.
NIM : 30101507462
Fakultas ; Kedokteran.
Universitas ; Universitas Islam Sultan Agung.

Telah melaksanakan penelitian di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pada bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Hubungan Antara Kadar LDL Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Significant Dan Non Significant.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 16 Jumadil Ula 1440 H
22 Januari 2019 M



RSI SULTAN AGUNG SEMARANG
ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.
Direktur Pendidikan

Lampiran 5. *Ethical Clearance*

KOMISI BIOETIKA PENELITIAN KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
 Sekretariat : Gedung C Lantai I Fakultas Kedokteran Unissula
 Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, Telp. 024-6583584, Fax 024-6594366

Ethical Clearance

No. 41/I/2019/ Komisi Bioetik

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, setelah melakukan pengkajian atas usulan penelitian yang berjudul :

HUBUNGAN ANTARA KADAR LDL DENGAN DERAJAT STENOSIS BERDASARKAN SIGNIFIKAN DAN NON SIGNIFIKAN
Studi observasional di RSI Sultan Agung Semarang Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner

Peneliti Utama : Hafida Zahra Hanun
 Pembimbing : dr. M. Saugi Abduh, Sp.PD., KKV., FINASIM
 Dra. Endang Lestari SS, M.Pd, M.Pd-Ked
 Tempat Penelitian : Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian diatas telah memenuhi prasyarat etik penelitian. Oleh karena itu Komisi Bioetika merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki dan panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI tahun 2004.

Semarang, 2 Januari 2019
 Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan
 Fakultas Kedokteran Unissula
 Ketua,

 (dr. Sofwan Daulan, Sp.F(K))

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

