

**PROGRAM STUDY ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Skripsi, Februari 2019**

ABSTRAK

Afifatul Azisyah

**HUBUNGAN ANATARA KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI (KPD)
DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA IBU HAMIL DI RUMAH
SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.**

40 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 12 lampiran

Latar Belakang : Ketuban pecah dini (KPD) adalah robeknya suatu membran fetus sebelum terjadinya suatu proses persalinan. Ketuban pecah dini terjadi sebelum usia 37 minggu yang dapat menyebabkan suatu kecemasan. Kecemasan adalah suatu kondisi emosional seseorang yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan rasa takut dan khawatir pada diri individu. Banyak faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu faktor internal dan external.

Methode : Desain dalam penelitian ini menggunakan metode survey analitik melalui pendekatan cross sectional .Sempel pada penelitian ini ada 40 responden dengan teknik total *sempling* . Data yang di peroleh di olah statistic menggunakan *uji Lambda*.

Hasil : Berdasarkan hasil analisa menjelaskan bahwa 14 responden (35.0%) dengan ketuban pecah dini (kpd) mengalami tingkat kecemasan panik sedangkan 26 responden (65.0%) yang tidak ketuban pecah dini mengalami tingkat kecemasan ringan,sedang,dan berat.

Kesimpulan : Ada hubungan antara kejadian ketuban pecah dini (kpd) dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang di dapatkan nilai *p* yaitu 0.00 dan *r* 0.650 hubungan sangat kuat.

Kata Kunci : Kejadian ketuban pecah dini , kecemasan , ibu hamil.

Daftar Pustaka : 30 (2007 - 2018).

**NURSING SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF NURSING SCIENCE
ISLAMIC SULTAN AGUNG UNIVERSITY OF SEMARANG
Thesis, February 2019**

ABSTRACT

Afifatul Azisyah

RELATIONSHIP BETWEEN THE EVENT OF PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANE (KPD) WITH AN LEVEL OF ANXIETY IN PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC SULTAN AGUNG HOSPITAL SEMARANG.

40 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 12 lampiran

Background: Early rupture of membranes (KPD) is the tear of a fetal membrane before the onset of labor. Premature rupture of membranes occurs before 37 weeks of age which can cause anxiety. Anxiety is an unpleasant emotional condition that is characterized by fear and worry in the individual. Many factors affect anxiety, namely internal and external factors.

Method: The design in this study used an analytical survey method through a cross sectional approach. The sample in this study was 40 respondents with a total sampling technique. The data obtained were statistically tested using the Lambda test.

Results: Based on the results of the analysis, it was explained that 14 respondents (35.0%) with premature rupture of membranes (kpd) experienced panic anxiety levels while 26 respondents (65.0%) who did not have premature ruptured membranes experienced mild, moderate, and severe anxiety levels.

Conclusion: There is a relationship between the incidence of premature rupture of membranes (kpd) and the level of anxiety in pregnant women at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang in getting p values which are 0.00 and r 0.650 relationships are very strong.

Keywords: The incidence of premature rupture of membranes, anxiety, pregnant women.

Bibliography : 30 (2007 - 2018).