

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Skripsi, Januari 2019**

ABSTRAK

Minkhatul Maula

HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN KEPATUHAN MENJALANI HEMODIALISA PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK (PGK) YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RSI SULTAN AGUNG

42 halaman + 8 tabel + 2 Gambar + 12 lampiran + xv

Latar Belakang : Pasien Ginjal Kronik (PGK) dengan ketergantungan dialisis dapat mengalami depresi. Depresi dapat menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan pasien dalam menjalani terapi HD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan menjalani hemodialisa pada pasien PGK yang menjalani HD di RSI Sultan Agung.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, jumlah responden sebanyak 48 responden dengan menggunakan *uji chi-square*

Hasil : Total 48 responden, terdapat 40 responden tidak depresi, 36 responden patuh menjalani HD dan 30 reponden tidak depresi yang patuh menjalani HD dengan *p value* 0,785.

Kesimpulan dan Saran : Tidak ada hubungan antara tingkat depresi dengan kepatuhan menjalani HD dengan *p value* 0,785. Hal yang bisa dilakukan perawat adalah memperhatikan aspek psikologis pasien dan mendorong keluarga berpartisipasi dalam terapi.

Kata kunci : Depresi, Kepatuhan, Hemodialisa

Daftar Pustaka : 45 (2007-2017)

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
FACULTY OF NURSING SCIENCE
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG
Mini Thesis, January 2019

ABSTRACT

Minkhatul Maula

CORRELATION BETWEEN DEPRESSION LEVELS WITH THE COMPLIANCE OF HEMODIALYSIS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) PATIENTS UNDERGOING HEMODIALISA IN RSI SULTAN AGUNG

42 pages + 8 tables + 2 pictures + 12 appendices + xv

Background: Chronic kidney patients (CKD) with dialysis dependence can experience depression. Depression can be one of the causes of patient non-compliance in undergoing HD therapy. Purpose of this study was to determine the correlation between depression levels with compliance of CKD patient undergo HD at Sultan Agung Hospital.

Method: This study was descriptive analitik with a cross sectional approach. Total of 48 respondents collected by total sampling technique used a chi-square test

Results: 48 respondents, there were 40 respondents who were not depressed, 36 respondents were obedient undergo HD and 30 respondents who were not depressed were obedient to undergo HD with p value 0.785.

Conclusions and Suggestions: There is no correlation between the level of depression and compliance to undergo HD, p value 0.785. What nurses can do is role to the psychological aspects and encourage families to participate in therapy.

Keywords: Depression, Compliance, Hemodialysis

Bibliography : 45 (2007-2017)