

PENERAPAN TERAPI PUKUL BANTAL GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGONTROL MARAH PADA PASIEN RPK

Himmatul ulya

Program studi DIII keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Latar belakang: Gangguan jiwa adalah seseorang yang terganggu mental nya, dan tidak bisa menggunakan pikiran nya secara normal. Salah satu gangguan jiwa yaitu Resiko perilaku kekerasan, Resiko perilaku kekerasan merupakan suatu kondisi dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan dan beresiko melukai seseorang. Oleh karena itu tujuan studi kasus ini untuk mengetahui keefektifan penerapan terapi pukul bantal pada pasien Rpk.

Tujuan : Untuk mengetahui keefektifan dari penerapan terapi pukul bantal pada pasien dengan diagnosa Resiko perilaku kekerasan.

Metode : Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kasus.

Hasil : Hasil yang didapatkan penulis, hari pertama sampai hari ke Empat setelah dilakukan tindakan terapi pukul bantal didapatkan hasil adanya penurunan skor RUFA.

Kesimpulan : Terapi pukul bantal efektif dalam mengatasi pasien dengan diagnosa Resiko perilaku kekerasan.

Kata kunci : Terapi pukul bantal. Resiko perilaku kekerasan

APPLICATION OF PILLOW CUSHION THERAPY TO IMPROVE THE ABILITY TO CONTROL ANGER IN PATIENTS RISK OF VIOLENT BEHAVIOR

Himmatul ulya

Program Study DIII Nursing, Faculty Of Nursing Sultan Agung Islamic
University Semarang

Abstract

Background : Mental disorder patient is someone who is mentally disturbed and cannot use his mind normally. One of the mental disorders is the risk of violent behavior, the risk violent behavior is one of the conditions in which a person carries out actions that can be dangerous and risks injuring someone. Therefore the purpose of this case study was to determine the effectiveness of applying cushion therapy to patients.

Objective : To determine the effectiveness of the application of cushion therapy to patients with a diagnosis of the risk of violent behavior.

Method : The research method used by the author was a case study method.

Results : the results obtained by the author on the first day to day, after the therapeutic treatment of the pillow were obtained as a result of a decrease in the RUFA a score.

Conclusion : Cushion therapy is effective in treating patients with a diagnosis of the risk of violent behavior.

Keywords : Cushion therapy. Risk of violent behavior.