

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN**  
**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**  
**Karya tulis Ilmiah, Mei 2019**

**ABSTRAK**

Izza Khoirun Nisa'

**PENERAPAN TEKNIK RELAKSASI AUTOGENIK : DZIKIR UNTUK  
MENURUNKAN SKALA NYERI PADA PASIEN POST SECTIO  
CAESAREA**

**Latar Belakang :** *Sectio Cesarea* (SC) adalah tindakan bedah untuk melahirkan bayi yang dilakukan dengan cara insisi pada dinding abdomen (WHO,2010). Data RISKESDAS (2010) menunjukkan tingkat persalinan SC 15,3% dari 20.591 ibu yang melahirkan pada 33 provinsi di Indonesia. Masalah yang sering terjadi pada pasien *post sectio caesarea* adalah nyeri. Penanganan nyeri dilakukan secara farmakologi dan non farmakologi. Upaya penanganan secara non-farmakologi salah satunya adalah dzikir. Metode dzikir memiliki banyak manfaat seperti memberikan ketenangan karena berdoa dan berserah diri.

**Tujuan :** Untuk menurunkan skala nyeri pada pasien *post sectio caesarea* di RSI Sultan Agung Semarang.

**Metode :** Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kasus.

**Hasil :** setelah dilakukan penerapan Teknik Relaksasi Autogenik : Dzikir selama 3x24 jam didapatkan hasil adanya penurunan skala nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea*. Pasien merasa lebih nyaman karena nyeri berkurang, dari skala 6 menjadi 4.

**Kesimpulan :** Terdapat pengaruh dzikir terhadap penurunan skala nyeri pada ibu *post Sectio Cesarea* (SC).

**Kata kunci :** Dzikir, Nyeri, *Sectio Caesarea* (SC)

**Tahun :** 2009-2017

**STUDY PROGRAM OF NURSING DIII**  
**FACULTY OF NURSING**  
**UNIVERSITY OF ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**  
**Karya tulis ilmiah, Mei 2019**

**ABSTRACT**

Izza Khoirun Nisa'

**APPLICATION OF AUTOGENIC RELAXATION TECHNIQUE : DZIKIR  
TO REDUCE THE SCALE OF PAIN IN MOTHERS POST - SECTIO  
CAESAREA**

**Background :** Sectio Caesarea (SC) is a surgical procedure to give birth to a baby done an incision in the abdominal wall (WHO 2010). Data from RISKESDAS (2010) shows section caesarea delivery rates of 15.3 % of 20,591 mothers giving birth in 33 provinces in Indonesia. The problem that often occurs in post - sectio Caesarea patients is pain handling is done pharmacologically and non-pharmacologically. One of the non-pharmacological treatment efforts is dzikir. The dzikir method has many benefits such as giving peace because of praying and surrender.

**Objective :** To reduce the scale of pain in post section cecarean patients at Sultan Agung Hospital in Semarang.

**Method :** The research method used by the writer is a case study method

**Result :** After the application of autogenic relaxation technique : dzikir 3x24 hours it was found that there was a decrease in the scale of pain in patients post operative Sectio Caesarea. The patients feel more comfortable because the pain decreases, from scale 6 to 4.

**Conclusion :** There is an effect of dzikir on decreasing pain scale in the mother post Sectio Caesarea (SC).

**Keywords :** Dzikir, Pain, Sectio Caesarea (SC)

**Year :** 2009-2017