

Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Fakultas Kedokteran
Program Studi D 3 Kebidanan
2015

ABSTRAK

Sri Wahyuni¹, Siti Thomas Zulaikhah ², Ulviana Novitasari²

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TM I TENTANG MUAL
MUNTAH DENGAN PERILAKU PENANGANAN MUAL MUNTAH DI BPM
YOHANA TR, S.SiT SEMARANG

xvii + 60 hal + 8 tabel + 3 bagan + 2 diagram + 12 lampiran

Kehamilan merupakan suatu proses dan fisiologis yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik demi tercapainya persalinan yang aman dan melahirkan bayi yang sehat sesuai harapan. Mual (nausea) dan muntah (emesis) adalah gejala yang sering terjadi, sekitar 60-80% primigravida dan 40-60% multigravida. Penyebab mual dan muntah ini bermacam-macam antara lain karena adanya perubahan hormon dalam tubuh, psikologis, kurang tidur, kurang istirahat dan stres dapat memperberat rasa mual dan muntah, sedangkan dampak dari mual muntah apabila tidak dilakukan penanganan yang baik adalah terjadi dehidrasi hingga koma, sedangkan pada janin terjadi BBLR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil TM I tentang mual muntah dengan perilaku penanganan mual muntah di BPM Yohana TR, S.SiT Semarang 2015.

Jenis penelitian menggunakan survei analitik observasional dengan pendekatan waktu *cross-sectional*, jumlah sampel 33 responden dengan teknik sampling total sampling. Uji hubungan antara variabel menggunakan uji korelasi *Fisher Exact*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden pada kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 14 responden (42,4%), cukup sebanyak 15 responden (45,5%) dan buruk 4 responden (12,1%), perilaku penanganan baik 16 responden (48,5%) dan buruk 17 responden (48,5%). Uji *Fisher Exact* nilai *p value* = 0,037.

Kesimpulan ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan mual muntah dengan perilaku penanganan mual muntah. Saran ibu hamil diharapkan dapat melakukan penanganan mual muntah dengan baik agar mual muntah tidak berdampak yang buruk bagi kesehatan.

Kata Kunci : Pengetahuan, Mual Muntah dan Perilaku.

Kepustakaan : 30 pustaka (2003 s/d 2013)

¹⁾ Mahasiswa Prodi D 3 Kebidanan

²⁾ Pembimbing Prodi D 3 Kebidanan

Sultan Agung Islamic University in Semarang
Faculty of Medical
D III Midwifery Studies Program
2015

Sri Wahyuni¹, Siti Thomas Zulaikhah ², Ulviana Novitasari²

ABSTRACT

RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE OF PREGNANT WOMEN TM I BEHAVIORAL TREATMENT WITH NAUSEA VOMITING NAUSEA VOMITING IN BPM Joanna TR, S.SiT Semarang

xvii + 60 thing table + 3 + 8 + 2 chart diagram + 12 enclosures

Pregnancy is a physiological process and need special care to be going well for the achievement of safe delivery and a healthy baby as expected. Nausea (nausea) and vomiting (Emesis) are a common symptom. Approximately 60-80% and 40-60% primigravid multigravida. The cause of nausea and vomiting among others due to a wide variety of hormonal changes in the body, piskologis, lack of sleep, lack of rest and stress can aggravate nausea and vomiting. The purpose of this study was to determine the relationship of the level of knowledge of pregnant women TM I of nausea and vomiting with behavioral treatment of nausea and vomiting in BPM Joanna TR, S.SiT Semarang 2015.

This type of research is using observational analytic survey with a cross-sectional approach, the number of samples 33 respondents with total sampling technique sampling. Test the relationship between variables using Fisher's Exact test correlation.

The results showed that the majority of respondents in the category of good level of knowledge as much as 14 respondents (42.4%), quite as much as 15 respondents (45.5%) and bad 4 respondents (12.1%), good handling behavior of 16 respondents (48, 5%) and bad 17 respondents (48.5%). From the statistical test p value = 0.037 there is a significant correlation between the level of knowledge of behavioral treatment of nausea and vomiting with nausea and vomiting with p value <0.05.

Conclusion the there is significant, significant between the level of knowledge of behavioral treatment of nausea and vomiting with nausea and vomiting. Suggestions for pregnant women, it is expected to perform better handling of nausea and vomiting with no impact of nausea and vomiting which is bad for health.

Keywords: Knowledge, Nausea Vomiting and Behavior.

Bibliography: 30 libraries (2003 s / d 2013)

- 1) Students Prodi DIII Midwifery
- 2) Supervising Prodi DIII Midwifery