

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SKRIPSI, AGUSTUS 2015**

ABSTRAK

Nur Handayani

**HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI TERHADAP PENYEMBUHAN
LUKA PERINEUM PASCA PERSALINAN NORMAL PADA IBU POST
PARTUM SPONTAN DI WILAYAH KERJA KECAMATAN GENUK
SEMARANG**

53 hal + 9 tabel + 2 gambar + 13 lampiran + xiv

Latar Belakang: Perdarahan postpartum menjadi penyebab kematian maternal. Kematian disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, nifas atau penanganannya. Salah satu penyebab perdarahan postpartum adalah perlukaan jalan lahir. Perlukaan ringan berupa luka lecet, yang berat berupa suatu robekan yang disertai perdarahan hebat. Proses penyembuhan luka perineum di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu status gizi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara status gizi terhadap penyembuhan luka perineum pasca persalinan normal di wilayah kerja Kec. Genuk Semarang.

Metode: penelitian ini menggunakan studi *analitik observasional* dengan pendekatan *cross sectional* dan metode pengambilan menggunakan *total sampling* dengan jumlah responden ibu postpartum. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan uji data menggunakan *chi square*.

Hasil: status gizi normal pada ibu postpartum di Klinik bersalin wilayah kerja Kec. Genuk Semarang sebagian besar luka perineum sembuh lebih cepat sebanyak 13 responden (72,2%) dan lambat sebanyak 5 responden (27,8%) sedangkan status gizi buruk sebagian besar proses penyembuhan luka perineum lambat sebanyak 10 responden (76,9%) dan cepat sebanyak (23,1%). Dari hasil uji *chi square* hubungan antara status gizi terhadap penyembuhan luka perineum didapatkan hasil $p = 0,0007$

Simpulan: Ada hubungan antara status gizi terhadap penyembuhan luka perineum pasca persalinan normal di wilayah kerja Kec. Genuk Semarang.

Kata kunci: status gizi, penyembuhan luka perineum, ibu postpartum.

Daftar pustaka: 38 (1996-2014)

**NURSING SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF NURSING
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY
Scripsi, AUGUST 2015**

ABSTRACT

Nur Handayani

**RELATIONSHIP STATUS OF NUTRITION HEALING WOUND
PERINEAL POST CHILDBIRTH NORMAL AT WORK AREA
DISTRICT GENUK SEMARANG.**

53 pages + 9 tables + 2 pictures + 13 attachments + xiv

Background : Postpartum haemorrhage causes of maternal death Death was caused by complications of pregnancy, childbirth, postpartum or handling One of the causes of postpartum hemorrhage is the birth canal injury. Mild injury such as abrasions, a heavy form of a tear that accompanied severe bleeding. Perineal wound healing process is influenced by several factors, one of which is nutrition status

The purpose of this study was to determine the relationship status of nutrition healing wound perineal post childbirth normal at work area district Genuk Semarang.

Methods: This study uses an analytic observational study with cross sectional approach and retrieval methods using total sampling the number of respondents postpartum mothers. Gathering data using questionnaires and data using the chi square test..

Results: normal nutrition status in postpartum mothers at the maternity clinic working area of the district. Genuk Semarang largely perineal wounds heal faster by 13 respondents (72.2%) and slow by 5 respondents (27.8%) while the poor nutritional status of the majority of perineal wound healing process is slow as many as 10 respondents (76.9%) and fast as many (23.1%). From the results of the chi square test the relationship between nutrition status of the perineal wound healing the results obtained $p = 0.0007$

Conclusion: There is a relationship status of nutrition healing wound perineal post childbirth normal at work area district Genuk Semarang.

Keywords : nutrition status, wound healing of the perineum, postpartum mothers..

Bibliography: 45 (1989-2011)