

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Skripsi, September 2012**

ABSTRAK

Amin Rahmawati

**PERBANDINGAN TINGKAT KECEMASAN YANG MENGGUNAKAN
KB SUNTIK TIGA BULAN DAN KB JENIS LAINNYA PADA IBU
GRANDE MULTIPARA DI PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN DAN
KULON SEMARANG**

59 hal + 9 tabel + xv

Latar belakang: Tingginya angka kematian ibu di Indonesia secara langsung diakibatkan oleh perdarahan, eklamsia dan infeksi. Kematian juga terjadi akibat empat ‘terlalu’ (terlalu banyak, terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan tingkat kecemasan yang menggunakan KB suntik tiga bulan dan KB jenis lainnya pada ibu grande multipara di Puskesmas Tlogosari Wetan dan Kulon Semarang.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain korelatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi berasal dari semua ibu grande multipara di wilayah kerja Puskesmas Tlogosari Wetan dan Kulon Semarang, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang berjumlah 43 orang. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis dilakukan secara univariat dengan uji statistik deskriptif, dan secara bivariat dengan uji *Mann Whitney*.

Hasil: uji *Mann Whitney* menghasilkan p-value 0,013 menunjukkan ada perbedaan tingkat kecemasan pada ibu grande multipara antara yang menggunakan KB suntik dan jenis KB lainnya.

Simpulan: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kecemasan ibu grande multipara yang menggunakan KB suntik dan jenis KB lainnya. Oleh karena itu disarankan bagi tenaga kesehatan untuk memberi dukungan positif dan konsultasi mengenai efek samping KB suntik untuk mereduksi tingkat kecemasan ibu grande multipara.

Kata kunci: kecemasan, penggunaan KB suntik dan jenis KB lainnya.

Daftar Pustaka: 31 (1997-2011)

**UNDERGRADUATE NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF NURSING SCIENCE
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG
Mini Thesis, September 2012**

ABSTRACT

Amin Rahmawati

COMPARATION OF THE ANXIETY LEVEL IN MULTIPAROUS GRANDE MOTHERS WHO USE THREE MONTHS INJECTION CONTRACEPTION AND THE OTHER KIND OF CONTRACEPTION IN THE PRIMARY HEALTH CENTER OF TLOGOSARI WETAN AND KULON SEMARANG

59 pages + 9 tables + xv

Background: The highly maternal mortality in Indonesia is directly caused by hemorrhage, eclampsia and infection. Deaths also occur due to the four 'too' (too much, too old, too young, and too close). The purpose of this study was to determine the relationship of anxiety level with the use of injection contraception 3-month and the other types of contraception in grande multiparous maternal in the Primary Health Center of Tlogosari Wetan and Kulon Semarang.

Methods: This is a correlative study that uses cross sectional design approach. Population comes from all of the grande multiparous mothers in the work area of Puskesmas Tlogosari Wetan and Kulon Semarang, while the sample is part of a population that is 43 grande multiparous mother. The research data obtained from questionnaires that have tested its validity and reliability. Univariate analysis was done with descriptive statistical tests, and bivariate with mann whitney u test.

Results: p-value that was obtained from mann whitney u test is 0.013 shows that there is a significantly differences in anxiety level of grande multiparous mothers who use three months injection contraception and the other types of contraception.

Conclusion: Based on these results, it can conclude that the difference of anxiety level in three months injection contraception use and the other types of contraception in grande multiparous maternal is significant. Therefore it is recommended for health workers to provide positive support and consultation regarding the side effects of injection contraception and the other types of it, in order to reduce the anxiety level in grande multiparous maternal.

Keywords: anxiety, use 3 month injection contraception and others.

Bibliographies: 31 (1997-2011)