

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Skripsi, Februari 2017**

ABSTRAK

Indah Ayu Mita Pengukir

**FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEJADIAN
KANKER SERVIKS DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG**

59 halaman + 19 Tabel + 3 Gambar + xi

Latar Belakang: Kanker serviks merupakan tumor ganas yang terdapat di daerah serviks. Faktor risiko kanker serviks adalah perilaku seksual berupa mitra seks *multiple*, paritas, nutrisi, rokok dan usia perkawinan yang terlalu muda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan kejadian kanker serviks.

Metode: Jenis penelitian ini yaitu *cross sectional*. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Jumlah responden sebanyak 80 orang dengan teknik *consecutive sampling*. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan uji *chisquare*.

Hasil: Hasil analisa data penelitian menunjukkan bahwa dari 80 responden, mayoritas responden memiliki paritas tinggi sebanyak 71,2%, usia pertama kali melakukan hubungan seksual dini sebanyak 62,5%, menggunakan kontrasepsi oral jangka panjang sebanyak 60,0%, merokok aktif sebanyak 20,0%, riwayat kanker serviks dalam keluarga 68,8% dan responden berusia sebanyak 58,8%. Hasil uji statistik didapatkan nilai hubungan paritas dengan kanker serviks *p-value* 0,000; usia pertama kali melakukan hubungan seksual *p-value* 0,029; kontrasepsi oral *p-value* 0,006; merokok *p-value* 0,412; riwayat penyakit dalam keluarga *p-value* 0,002; usia *p-value* 0,002. Faktor yang paling memengaruhi kejadian kanker serviks adalah usia dengan nilai OR 5,704.

Simpulan: Ada hubungan antara paritas, usia pertama kali melakukan hubungan seksual, kontrasepsi oral, riwayat penyakit dalam keluarga dan usia. Faktor yang paling kuat hubungannya adalah usia

Kata kunci: faktor-faktor yang mempengaruhi kanker serviks.

Daftar Pustaka: (2007-2016)

**UNDERGRADUATE NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF NURSING SCIENCE
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG
Mini Thesis, February 2017**

ABSTRACT

Indah Ayu Mita Pengukir

**FACTORS WHO ABLE TO INFLUENCE INCIDENCE OF CERVIC
CANCER IN RSUP DR. KARIYADI SEMARANG**

59 pages + 19 Table + 3 pictures + xi

Background : Cervix cancer is malignant tumor who be found in cervix area. Risk factor for cervix cancer is sexual behavior the form multiple sex partners, parity, nutrients, smoke, and The marriage age is still young. This research has purposed to test to know factor who the most relation by the incidence of cervix cancer.

Method : This research it is cross sectional. Collected data by questioner. Amount of respondents was 80 with consecutive sampling technique. The data obtained were processed statistically by chi-square test.

Result : This research data shown that 80 respondents majority has high parity 71,2%, the age of first do sexual early age 62,5%, using oral contraception long-term total 60,0%, active smoker 20,0%, the history of cervical cervix in family member 68,8%, and respondents who have age over 35 old 58,8%. Result statistic has value p-value 0,029; oral contraception p-value 0,006; smoke p-value 0,412; history of cervical cervix in family member p-value 0,002; age p-value 0,002. Factor who the most influence cervix cancer is age with value OR 5,704.

Conclusion : There's is relation between parity, the age of first do sexual early, oral contraception, history of cervical cervix in family and age. Factor who the most has relation is age

Keyword : factors who influence cervix cancer

Bibliography : 2007-2016